

Prospect: Informații pentru utilizator**Bromhexin Atb 8 mg comprimate**
clorhidrat de bromhexin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 2-3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Bromhexin Atb și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bromhexin Atb
3. Cum să utilizați Bromhexin Atb
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Bromhexin Atb
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Bromhexin Atb și pentru ce se utilizează

Bromhexin Atb face parte din clasa de medicamente cunoscute sub denumirea de preparate pentru tratamentul tusei și răcelii; expectorante, exclusiv combinații cu antitusive, mucolitice.

Bromhexin Atb împiedică acumularea de mucus vâcos, fluidificând secreția bronșică și ușurând tusea.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bromhexin Atb**Nu utilizați Bromhexin Atb:**

- dacă sunteți alergic la clorhidrat de bromhexin sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-Dacă suferiți de ulcer gastro-duodenal, boală renală sau hepatică severă, astm bronșic.

-Dacă luați și medicamente antitusive. Luați aceste medicamente în combinație, doar la recomandarea medicului.

Bromhexin Atb împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Dacă luați acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acțiune. Consultați medicul în condițiile în care mai luați: medicamente antitusive (cum este codeina), sau medicamente iritante la nivelul stomacului.

Administrarea clorhidratului de bromhexin în același timp cu antibiotice (de exemplu amoxicilină, eritromicină, cefalexină, doxiciclină, oxitetraciclină) îmbunătățește distribuția acestora la nivel pulmonar.

Bromhexin Atb împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu se cunosc interacțiunile între bromhexin și alimente sau băuturi.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece acest medicament traversează bariera placentară, administrarea acestui medicament se va evita, mai ales în primele 3 luni de sarcină.

Nu se recomandă administrarea de bromhexin în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Bromhexin Atb nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Bromhexin Atb conține lactoză monohidrat.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Bromhexin Atb

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală este la adulți de 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, maximum 6 comprimate pe zi.

La copii cu vârsta sub 10 ani se recomandă utilizarea unor forme farmaceutice adaptate vârstei.

La copii peste 10 ani este de ½-1 comprimat de 3 ori pe zi.

Nu zdrobiți și nu mestecați comprimatele. Înghițiți-le întregi, cu o cantitate suficientă de apă.

Nu depășiți 8-10 zile de tratament fără recomandarea medicului.

Dacă utilizați mai mult Bromhexin Atb decât trebuie

Luarea oricărui medicament în exces poate avea serioase consecințe. Dacă suspectați supradozajul, anunțați de urgență medicul.

Dacă uitați să utilizați Bromhexin Atb

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Este important să nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Bromhexin Atb

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Acestea sunt în general ușoare și trecătoare: erupții cutanate, urticarie, dureri abdominale, greață, vărsături, diaree, creșterea valorilor enzimelor hepatice.

Rar, pot apărea și reacții mai grave: tulburări ale sistemului imunitar (reacții de hipersensibilitate): edeme, dificultăți de respirație, febră, frisoane, iar în cazuri izolate poate surveni chiar șoc anafilactic, cefalee, amețală.

La unii pacienți incapabili de o expectorație eficientă, se poate produce accentuarea obstrucției bronhice.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. Cum se păstrează Bromhexin Atb

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați medicamentul după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizați Bromhexin Atb dacă observați semne vizibile de deteriorare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Bromhexin Atb

-Substanța activă este clorhidrat de bromhexin. Fiecare comprimat conține clorhidrat de bromhexin 8 mg.

-Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină tip 101, amidon de porumb, talc, stearat de magneziu.

Cum arată Bromhexin Atb și conținutul ambalajului

Comprimate rotunde, plate, de culoare albă.

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate

Cutie cu 200 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr.1, 707410 Iași, România

Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2016.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>